

RECOVER FASTER

(Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid)

12mg/1.2ML STABHA™

keeping active people active

SportVis



Fanning Technique Injection

dilakukan dalam 1x suntikan



Fase I



Fase II



Fase III

1/3 bagian SportVis diinjeksikan untuk setiap fase injeksi.

- Dianjurkan untuk memberikan SportVis dalam waktu 48 Jam setelah cedera
- Injeksi kedua diberikan 48 - 72 Jam setelah injeksi pertama
- Hasil yang lebih optimal bila diberikan bersama dengan metode R.I.C.E.

FASTER & BETTER RECOVERY




12mg/1.2ml of STABHA

Pertama dan satu-satunya produk yang dipatenkan untuk indikasi ankle sprain dan epicondylitis grade I dan II.

SportVis mampu memperbaiki kualitas hidup pasien karena :

- Mengoptimalkan dan mempercepat proses pemulihan sehingga dapat mengurangi resiko kambuh kembali.
- Memperbesar dan mempercepat Range of Movement (ROM) sehingga pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal.
- Mengurangi jumlah hari absen dari pekerjaan atau olahraga.
- Mengurangi efek samping dari penggunaan obat NSAID.



"HA specifically binds to fibrin... increase and stabilize the volume and physical structure of the fibrin gel. HA can hydrate a large amount of water and readily form a porous viscoelastic gel." Weigel et al*



*Artist impression
* As suggested in HA published literature*

SportVis fibrin complex

Sportvis™-fibrin complex berfungsi sebagai:

- Struktur pendukung pada tempat cedera
- Meningkatkan kualitas perbaikan jaringan lunak
- Meningkatkan laju penyembuhan
- Mengatur migrasi sel sehingga mengurangi rasa nyeri dan inflamasi



Under license from :
MDT Int'l s.a.
Geneva - Switzerland
www.mdtint.com

Marketed by :
Axelia Healthcare
A Division of PT. Pro-Health Internationa;